

Chikara



HERBICIDE CHIKARA^{MC}

CHIKARAMC est un herbicide à large spectre qui offre une action systémique et résiduaire. Sa matière active, le flazasulfuron, élimine les principales mauvaises herbes aux stades de prélevée et de postlevée (activité résiduaire dans le sol). Il maîtrise plusieurs mauvaises herbes et graminées annuelles et vivaces, y compris les trèfles, la stellaire, le pissenlit, la sétaire, les laiterons, le souchet, le séneçon, la mauve négligée et l'ivraie.

CHIKARAMC est actif à de faibles concentrations et demeure dans les couches superficielles du sol. Il n'a aucun effet sur la germination mais il est absorbé par les racines des jeunes plantes. La plupart du temps, les mauvaises herbes n'émergent pas du sol; les feuilles des rares plantes qui y parviennent jaunissent et meurent rapidement.

Matière active :

Flazasulfuron 25 %

Cultures principales :

Bluet nains, raisins

Group d'herbicide :

Group 2

Conditionnement :

6 x 404g

Faible dose d'application

L'herbicide CHIKARAMC renferme 250 g de flazasulfuron par kilogramme, ce qui permet une faible dose d'application de 150 g à 200 g à l'hectare.

Large fenêtre d'application

L'herbicide CHIKARAMC peut être appliqué à tout moment de l'année, mais l'application printanière procure de meilleurs résultats. Lorsque les herbes sont déjà établies, l'association d'un produit comme le glyphosate est recommandée dans le mélange en cuve afin d'élargir le spectre d'activité.

Maîtrise pendant toute la saison

Après une application printanière, l'action de l'herbicide CHIKARAMC persiste toute la saison, ce qui élimine généralement le besoin d'appliquer un herbicide plus tard en saison.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION DE CHIKARAMC

Culture	Application	Délai de sécurité	Délai avant la récolte	Dose pour toutes les applications
Lowbush Blueberries	Effectuer une seule application à l'automne sur les champs dormants, rénovés/élagués, avant l'année de croissance végétative, ou effectuer une seule application au printemps sur les champs dormants, avant l'année de croissance végétative.	12 hrs	s.o.	150 - 200 grams / hectare in 150 – 450 Litres of water
Grapes	N'appliquer que sur les vignes plantées depuis 3 ans ou plus. Ne pas faire plus d'une application par année. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt au printemps avant l'apparition des mauvaises herbes.		75 days	

CHIKARA^{MC} maîtrise un large éventail de mauvaises herbes à feuilles larges et de graminées. Consulter l'étiquette pour obtenir une liste complète.

CHIKARAMC est une marque de commerce d'Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Toujours lire les directives de l'étiquette et s'y conformer.