

K.O.
PREMIER
ROUND



FUJIMITE MITICIDE / INSECTICIDE

FUJIMITE est un miticide/insecticide de contact offrant un large spectre de contrôle des acariens. Fujimite arrête immédiatement les dommages causés par l'alimentation après l'application. Il agit sur tous les stades de développement des acariens et offre une activité ovicide sur les œufs.

FUJIMITE est compatible avec la lutte intégrée des ravageurs et constitue un excellent choix pour la gestion de la résistance.



FUJIMITE PRODUCT DETAILS

À utiliser sur: Tomates de serre, poivrons, aubergines, concombres et plantes ornementales

L'ingrédient actif: Fenpyroximate

La Formulation: Suspension commerciale

L'emballage: 6 x 1 L jug

Mode d'action: inhibiteur. Arrête immédiatement l'alimentation en bloquant le transport électronique mitochondrial - arrête la ponte en quelques heures.

FRAC Group: 21

Principaux ravageurs contrôlés: Acariens rouges, Acariens cyclamens, Mouches blanches (suppression)



Avantages clés

- Élimination rapide des acariens (larvae, nymphes & adultes)
- Action résiduelle de longue
- Emballage économique pratique
- Efficacité très

FUJIMITE DIRECTIVES D'APPLICATION

Dans les serres, n'entrez pas et ne permettez pas la ré-entrée des travailleurs pendant 12 heures après l'application. Pour toutes les autres applications, ne permettez pas la ré-entrée tant que tous les résidus n'ont pas séché.

| Cultures | Parasite | Taux & Eau Volume | RECOMMANDATIONS | Intervalle | PHI |
|---|--|--------------------------------|--|------------|--------|
| Ornementales | Araignée Rouge | 1.25 – 1.9 in 1000 L Eau / ha. | Appliquez lorsque les nuisibles sont à des stades immatures Doit être appliqué avant les dommages aux cultures Alterner avec une chimie différente | 21 jours | NA |
| | Broad Mite, Cyclamen Mite | 1.9 L in 1000 L Eau / ha. | Ne pas appliquer à aucun type de fleur coupée. | | |
| | Aleurodes (suppression only) | | Ne pas dépasser 7.6 L product / ha. / yr. Ne pas dépasser 1.9 L / ha. / Application. | | |
| Serre Tomate, Poivre, Concombre, Aubergine | Araignée Rouge Aleurodes (suppression only) | 2.5 L in 1000 L Eau / ha. | Ne pas appliquer plus d'une fois par cycle de culture. | NA | 1 jour |

N'appliquez pas à travers le système d'irrigation. N'appliquez pas sous forme de fumée, de brouillard ou d'aérosol. N'utilisez pas n'importe quel type d'équipement à air comprimé pour l'application. N'appliquez pas aux plantes utilisées pour l'alimentation animale. Ne contaminez pas les réserves d'eau d'irrigation ou potable, ni les habitats aquatiques.